Exponentielles (chapitre 3) Résumé

Au départ $\exp$ est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ et vérifiant $\exp(0) = 1$ et $\exp' = \exp$.

On note $\exp(1) = e$. On pourrait prouver que $e \approx 2,718$.

Ayant prouvé que pour tout entier positif n , $\exp(n) = e.e.e\dots e = e^n$, c'est-à-dire e à la puissance n (on dit aussi e exposant n), on écrit e^x à la place de $\exp(x)$ pour tout réel x (même si x n'est pas un entier).

Pour tous réels a, b, x , $e^a e^b = e^{a+b}$, notamment $(e^x)^2 = e^{2x}$. $e^{-b} = \frac{1}{e^b}$. On a donc $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$,

et aussi pour tout réel x , $e^x > 0$ (puisque $e^x = (e^{x/2})^2$) ; donc $\exp' = \exp > 0$ et $\exp$ strictement ↗.

Conséquences : $a = b \Leftrightarrow e^a = e^b$. $a < b \Leftrightarrow e^a < e^b$. $a \leq b \Leftrightarrow e^a \leq e^b$.

Exemple : voir que $e^3 = e.e.e < e^{3.5} < e^4 = e.e.e.e$...mais $e^{3.5}$ n'est pas une puissance.

Remarques : $e^0 = 1$ donc $1 \leq e^x \Leftrightarrow 0 \leq x$. $e^1 = e \approx 2,718$. $e^{-1} = 1/e \approx 0,37$ (moins important).

Si n est un entier ($n \geq 0$ ou $n \leq 0$), alors $(e^x)^n = e^{nx}$ (preuve par récurrence si $n \geq 0$).

En étudiant (avec la dérivée) la fonction $g : x \mapsto e^x - (x+1)$, on prouve facilement que pour tout réel x , $e^x \geq x+1$ (graphiquement : $C_{\exp}$ est au dessus de sa tangente en 0).

On en déduit (avec le théorème de comparaison) : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x) = +\infty$.

On a alors en posant $X = -x$: $\lim_{X \rightarrow -\infty} (e^X) = 0 (0^+)$.

Ces résultats se lisent sur le dessin $C_{\exp}$ (voir ci-dessous). Il faut retenir aussi les deux résultats suivants :

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x}{x} \right) = +\infty$ (évident sur un dessin) et $\lim_{X \rightarrow -\infty} (X \cdot e^X) = 0$ (pas évident).

A retenir car a priori ce sont des formes indéterminées.

En résumé : dans les deux cas, « l'exponentielle l'emporte sur le x ».

Dérivées : si u est dérivable, e^u l'est aussi et $(e^u)' = u' \cdot e^u$, c'est-à-dire $(e^{u(x)})' = u'(x) \cdot e^{u(x)}$, notamment si k est une constante : $(e^{kx})' = k \cdot e^{kx}$ et $(e^{kx^2})' = 2kx \cdot e^{kx^2}$...et encore $(e^{-kx})' = -k \cdot e^{-kx}$.